

Information om reduktion af mandler.

Dit barn skal have reduceret sine mandler, så der bliver bedre plads i svælget.

Mandlerne består af lymfevæv lige som lymfeknuder. De kan være så store at de giver problemer, når barnet skal spise, så barnet har tendens til at fejlsynke, det vil sige at få maden galt i halsen. Hvis mandlerne er meget store kan barnets stemme også lyde grødet, som om barnet ”taler med en kartoffel i munden”. Store mandler kan også give tendens til snorken og søvnproblemer.

Dit barn skal opereres den _____

Du vil blive ringet op ang. tidspunktet torsdag eller fredag den _____

Før operationen:

Da operationen foregår i narkose/fuld bedøvelse, skal dit barn faste i 6 timer før ankomsten til klinikken, det vil sige, at dit barn ikke må have spist noget i 6 timer, før I ankommer. Barnet må heller ikke få slik, tyggegummi eller andet i fasteperioden.

Dit barn må gerne få lidt vand indtil 2 timer, før I kommer, men ikke mælk, juice, sodavand, smoothie eller lignende.

Dit barn skal have smertestillende senest to timer før operationen. Du skal give paracetamol som for eksempel Panodil eller Pinex, som mikstur eller stikpille svarende til barnets alder og vægt.

Medicin: _____

Hvis man er kørende i bil, skal dit barn være ledsaget af to voksne på hjemturen.

Operationen:

Narkosen gives af en narkoselæge. Narkosen gives ved at barnet trækker vejret gennem en maske med narkosegas. Herefter lægges et lille rør ned i halsen for at sikre vejtrækningen. Lægen vil under operationen fjerne noget af mandlerne med en ”elektrisk saks”. Det hele tager 20-30 minutter. Bagefter skal I blive i klinikken til dit barn er helt vågnet op, læge vil kontrollere barnet inden I går hjem.

Efter operationen:

Lægen tilser dit barn inden I kan tage hjem.

I skal møde til kontrol den _____



Forholdsregler:

Barnet skal holdes i ro resten af dagen for operationen og dagen efter. Vi anbefaler at holde barnet hjemme fra institution/skole i 1 uge efter operationen.

Det er vigtigt at give dit barn rigeligt koldt at drikke (uden brus). Dit barn må spise, hvad barnet ønsker. Ofte er der dog ømhed i svælget, og det vil være rart med noget koldt og blødt som f.eks. yoghurt og is.

Hvis du kigger dit barn i halsen, kan du se, at der er nogle hvid/gullige/grå belægninger på mandlerne. Det er en del af helingsprocessen, belægninger (sårskorperne) vil falde af i løbet af ca. 10 dage.

Komplikationer:

Lidt blod i opspytet er tilladeligt, men kommer der lidt blødning kan du give dit barn lidt knust is. Stopper blødningen ikke kan du kontakte klinikken på 56142355, nærmeste skadestue, eller Øre-næse-halsafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge på 56631500. Efterblødning er uhyre sjældent.

Venlig hilsen
Speciallægen

2020.04.01.v5.



Ørenæsehalsklinikken Solrød Strand
Gyvelvej 2. 2680 Solrød Strand.
Tlf.: 56142355